



Cerf, Grand lac du – Suivi du périphyton en 2015

Numéro RSVL	0144
Région(s) administrative(s)	Laurentides
Municipalité(s)	Lac-du-Cerf
Date(s) des observations	26, 28 et 29 juillet 2015 et 3, 7, 9 et 14 août 2015

Épaisseur moyenne du tapis de périphyton




Probabilité d'enrichissement en nutriments dans le littoral

- Peu probable
- Probable
- Très probable

Pour chaque site et pour l'ensemble du lac, les bandes grises représentent l'épaisseur moyenne du périphyton et les barres colorées illustrent la marge d'erreur autour de cette moyenne. À l'échelle du lac, l'épaisseur moyenne du tapis de périphyton est de 2,4 mm. Comme la marge d'erreur se situe entièrement sous la valeur seuil de 4 mm, cela suggère qu'il n'y a pas d'enrichissement en nutriments dans le littoral. Toutefois, pour le site 7, la marge d'erreur dépasse le seuil de 4 mm d'épaisseur, ce qui suggère un enrichissement en nutriments à cet endroit.

Les caractéristiques du périphyton peuvent varier d'un secteur à l'autre en fonction des apports locaux en nutriments, mais aussi en fonction de la présence d'herbivores aquatiques, de la lumière disponible ou de l'exposition au vent et aux courants.

Caractéristiques du périphyton



À l'échelle du lac, 7 % des roches inspectées ont un recouvrement faible, 49 % ont un recouvrement moyen et 44 % ont un recouvrement élevé. Les sites d'échantillonnage 2, 11 et 12 se démarquent par un recouvrement particulièrement élevé.

Parmi les tapis de périphyton observés, 71 % sont bruns, 24 % sont verts et 6 % présentent un mélange de brun et de vert.

Aucun filament de périphyton n'a été observé.

Une augmentation du recouvrement, l'apparition de filaments ou une variation de couleur sont des signes à surveiller dans le temps pour détecter un changement dans le milieu.

Pour plus d'information, consultez le [document d'aide à l'interprétation](#).