



Lac Lanthier – Suivi du périphyton en 2020

Numéro RSVL	0285
Région(s) administrative(s)	Laurentides
Municipalité(s)	L'Ascension et Rivière-Rouge
Date(s) des observations	10 août 2020

Épaisseur moyenne du tapis de périphyton




Probabilité d'enrichissement en nutriments dans le littoral

- Peu probable
- Probable
- Très probable

Pour chaque site et pour l'ensemble du lac, les bandes grises représentent l'épaisseur moyenne du périphyton et les barres colorées illustrent la marge d'erreur autour de cette moyenne. À l'échelle du lac, l'épaisseur moyenne du tapis de périphyton est de 1,9 mm. Comme la marge d'erreur se situe entièrement sous la valeur seuil de 4 mm, cela suggère qu'il n'y a pas d'enrichissement en nutriments dans le littoral.

Les caractéristiques du périphyton peuvent varier d'un secteur à l'autre en fonction des apports locaux en nutriments, mais aussi en fonction de la présence d'herbivores aquatiques, de la lumière disponible ou de l'exposition au vent et aux courants.

Caractéristiques du périphyton



Les résultats sont exprimés en pourcentage de roches observées présentant chaque caractéristique.

À l'échelle du lac, 3 % des roches inspectées ont un recouvrement faible, 48 % ont un recouvrement moyen et 48 % ont un recouvrement élevé. Les sites d'échantillonnage 5 et 6 se démarquent par un recouvrement particulièrement élevé.

Parmi les tapis de périphyton observés, 93 % sont bruns et 7 % présentent un mélange de brun et de vert.

Des filaments de périphyton sont présents sur 42 % des roches examinées autour du lac. Parmi les roches où des filaments sont observés, 72 % présentent des filaments bruns et 28 % présentent des filaments avec une combinaison de brun et de vert.

Une augmentation du recouvrement, l'apparition de filaments ou une variation de couleur sont des signes à surveiller dans le temps pour détecter un changement dans le milieu.

Pour plus d'information, consultez le [document d'aide à l'interprétation](#).