


Lac Ouimet – Suivi du périphyton en 2019

Numéro RSVL 0456
Date(s) des observations 31 juillet 2019 et 1 août 2019

Épaisseur moyenne du tapis de périphyton




Probabilité d'enrichissement en nutriments dans le littoral

- Peu probable
- Probable
- Très probable

Pour chaque site et pour l'ensemble du lac, les bandes grises représentent l'épaisseur moyenne du périphyton et les barres colorées illustrent la marge d'erreur autour de cette moyenne. À l'échelle du lac, l'épaisseur moyenne du tapis de périphyton est de 1,6 mm. Comme la marge d'erreur se situe entièrement sous la valeur seuil de 4 mm, cela suggère qu'il n'y a pas d'enrichissement en nutriments dans le littoral.

Les caractéristiques du périphyton peuvent varier d'un secteur à l'autre en fonction des apports locaux en nutriments, mais aussi en fonction de la présence d'herbivores aquatiques, de la lumière disponible ou de l'exposition au vent et aux courants.

Caractéristiques du périphyton



À l'échelle du lac, 20 % des roches inspectées ont un recouvrement faible, 31 % ont un recouvrement moyen et 48 % ont un recouvrement élevé. Les sites d'échantillonnage 6, 8, 10, 11 et 13 se démarquent par un recouvrement particulièrement élevé.

Les tapis de périphyton présentent tous une combinaison de brun et de vert.

Des filaments de périphyton sont présents sur 44 % des roches examinées autour du lac. Parmi les roches où des filaments sont observés, 88 % présentent des filaments avec une combinaison de brun et de vert et 12 % présentent des filaments bruns.

Une augmentation du recouvrement, l'apparition de filaments ou une variation de couleur sont des signes à surveiller dans le temps pour détecter un changement dans le milieu.

Pour plus d'information, consultez le [document d'aide à l'interprétation](#).