


Lac Saint-Amour – Suivi du périphyton en 2021

Numéro RSVL	0231
Région(s) administrative(s)	Laurentides
Municipalité(s)	Sainte-Anne-des-Lacs
Date(s) des observations	22 juillet 2021

Épaisseur moyenne du tapis de périphyton




Probabilité d'enrichissement en nutriments dans le littoral

- Peu probable
- Probable
- Très probable

Pour chaque site et pour l'ensemble du lac, les bandes grises représentent l'épaisseur moyenne du périphyton et les barres colorées illustrent la marge d'erreur autour de cette moyenne. À l'échelle du lac, l'épaisseur moyenne du tapis de périphyton est de 4,3 mm. Comme la marge d'erreur se situe entièrement au-dessus de la valeur seuil de 4 mm, cela suggère un enrichissement en nutriments dans le littoral. On observe toutefois une variabilité importante entre les sites.

Les caractéristiques du périphyton peuvent varier d'un secteur à l'autre en fonction des apports locaux en nutriments, mais aussi en fonction de la présence d'herbivores aquatiques, de la lumière disponible ou de l'exposition au vent et aux courants.

Caractéristiques du périphyton



Sur toutes les roches inspectées autour du lac, on observe un recouvrement élevé par le tapis de périphyton.

Parmi les tapis de périphyton observés, 92 % sont bruns et 8 % présentent un mélange de brun et de vert.

Aucun filament de périphyton n'a été observé.

Une augmentation du recouvrement, l'apparition de filaments ou une variation de couleur sont des signes à surveiller dans le temps pour détecter un changement dans le milieu.

Pour plus d'information, consultez le [document d'aide à l'interprétation](#).