


## Lac Gareau – Suivi du périphyton en 2024

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Numéro RSVL                 | 0490                      |
| Région(s) administrative(s) | Mauricie                  |
| Municipalité(s)             | Saint-Mathieu-du-Parc     |
| Date(s) des observations    | 17, 18 et 30 juillet 2024 |

### Épaisseur moyenne du tapis de périphyton




### Probabilité d'enrichissement en nutriments dans le littoral

- Peu probable
- Probable
- Très probable

Pour chaque site et pour l'ensemble du lac, les bandes grises représentent l'épaisseur moyenne du périphyton et les barres colorées illustrent la marge d'erreur autour de cette moyenne. À l'échelle du lac, l'épaisseur moyenne du tapis de périphyton est de 0,9 mm. Comme la marge d'erreur se situe entièrement sous la valeur seuil de 4 mm, cela suggère qu'il n'y a pas d'enrichissement en nutriments dans le littoral.

Les caractéristiques du périphyton peuvent varier d'un secteur à l'autre en fonction des apports locaux en nutriments, mais aussi en fonction de la présence d'herbivores aquatiques, de la lumière disponible ou de l'exposition au vent et aux courants.

## Caractéristiques du périphyton



À l'échelle du lac, 42 % des roches inspectées ont un recouvrement faible, 42 % ont un recouvrement moyen et 16 % ont un recouvrement élevé.

Les tapis de périphyton observés sont tous de couleur verte.

Aucun filament de périphyton n'a été observé.

Une augmentation du recouvrement, l'apparition de filaments ou une variation de couleur sont des signes à surveiller dans le temps pour détecter un changement dans le milieu.

Pour plus d'information, consultez le [document d'aide à l'interprétation](#).