



Lac des Îles – Suivi du périphyton en 2018

Numéro RSVL	0705
Région(s) administrative(s)	Outaouais
Municipalité(s)	Blue Sea et Gracefield
Date(s) des observations	30 juillet 2018 et 9 août 2018

Épaisseur moyenne du tapis de périphyton




Probabilité d'enrichissement en nutriments dans le littoral

- Peu probable
- Probable
- Très probable

Pour chaque site et pour l'ensemble du lac, les bandes grises représentent l'épaisseur moyenne du périphyton et les barres colorées illustrent la marge d'erreur autour de cette moyenne. À l'échelle du lac, l'épaisseur moyenne du tapis de périphyton est de 4,0 mm. Comme la marge d'erreur englobe la valeur seuil de 4 mm, cela suggère qu'il y a probablement un enrichissement en nutriments dans le littoral. Pour 4 des 12 sites, la marge d'erreur dépasse le seuil de 4 mm d'épaisseur, ce qui suggère un enrichissement en nutriments à ces endroits.

Les caractéristiques du périphyton peuvent varier d'un secteur à l'autre en fonction des apports locaux en nutriments, mais aussi en fonction de la présence d'herbivores aquatiques, de la lumière disponible ou de l'exposition au vent et aux courants.

Caractéristiques du périphyton



Sur la majorité des roches inspectées autour du lac, on observe un recouvrement élevé par le tapis de périphyton.

Les tapis de périphyton présentent tous une combinaison de brun et de vert.

Des filaments de périphyton sont présents sur 1 % des roches examinées autour du lac et ils présentent tous une combinaison de brun et de vert.

Une augmentation du recouvrement, l'apparition de filaments ou une variation de couleur sont des signes à surveiller dans le temps pour détecter un changement dans le milieu.

Pour plus d'information, consultez le [document d'aide à l'interprétation](#).